

Zal PTNS mij helpen?

Wetenschappelijke studies met het Urgent PC-systeem voor PTNS tonen aan dat 2 van de 3 behandelde patiënten een vermindering hebben van hun OAB-symptomen van urinaire aandrang, frequentie en incontinentie. Heel wat personen met een OAB worden succesvol behandeld met PTNS nadat andere therapieën faalden. Afhankelijk van uw symptomen en uw reactie op PTNS kan uw arts beslissen dat PTNS alleen voor u voldoende is of dat het gecombineerd moet worden met een andere behandeling.

Wat zeggen patiënten die met PTNS behandeld werden over hun ervaring?

*"Ik was vastbesloten dit probleem te overwinnen, dus ik probeerde een farmaceutisch product dat vaak voorgeschreven wordt voor een overactieve blaas. Maar het inname schema en de neveneffecten pasten niet bij mijn levensstijl ... Dankzij deze therapie kon ik volledig stoppen met de geneesmiddelen." - Ellie**

*"Deze therapie is als een wonder voor mij ... Mijn kwaliteit van leven is aanzienlijk verbeterd. Voor mij is de meest belangrijke verbetering dat ik nu goed uitgerust ben. Ik voel me ook bevrijd van de constante bezorgdheid over ongelukjes." - Iris**

* De resultaten kunnen variëren, niet alle patiënten verkrijgen hetzelfde resultaat.

Percutane tibiale neurostimulatie (PTNS) met het Urgent® PC neuromodulatiesysteem:

- Aangewezen voor OAB-symptomen van urinaire aandrang, frequentie en incontinentie
- Poliklinische behandeling: geen operatie vereist.
- Uiterst doeltreffend: klinische studies toonden aan dat de meeste patiënten die PTNS gebruikten een aanzienlijke verbetering merkten in de controle over hun blaas
- Weinig risicovol, gepaard met minimale bijwerkingen



Urgent® PC neuromodulatiesysteem

Vraag uw arts of PTNS geschikt is voor u

Als u een Overactieve Blaas (OAB) heeft, dan bent u niet de enige. Meer dan 16% van de volwassen bevolking lijdt aan OAB-symptomen.¹

Een nieuwe therapie gebruikt het Urgent® PC neuromodulatiesysteem: een techniek zonder geneesmiddelen of operatie voor het beheersen van de OAB-symptomen van urine aandrang, frequentie en incontinentie.

Vraag uw arts om meer informatie over Urgent PC en neurostimulatie.

1. Stewart WF, Rooyen JBV, Cundiff GW, Abrams P, Herzog AR, Corey R, Hunt TL, Wein AJ. Prevalence and burden of overactive bladder in the United States, World J Urol 20:327-336 2003.

Uroplasty BV
Hofkamp 2 • 6161 DC Geleen • Nederland

Uroplasty Ltd
Manchester Business Park • 3000 Aviator Way
Manchester M22 5TG • Verenigd Koninkrijk

www.uroplasty.com

Urgent en Uroplasty zijn gedeponeerde handelsmerken.
© 2005 Uroplasty. Alle rechten voorbehouden.
0525002 -Dutch 07/07

Staat uw leven in het teken van uw overactieve blaas?

U bent niet de enige. Ongeveer 1 op 6 volwassenen lijdt aan een overactieve blaas.



Er is nu een eenvoudige, doeltreffende poliklinische behandeling:

Geen geneesmiddelen. Geen operatie.

URGENT® PC
Neuromodulatiesysteem

Wat is een “overactieve blaas”?

Een overactieve blaas (OAB) is een algemene term die gebruikt wordt voor een aantal blaas problemen. De symptomen van een overactieve blaas zijn onder meer:

- Frequentie – frequent urineren (meer dan 8 keer in 24 uur)
- Nachtelijke frequentie – frequent urineren (2 keer of meer per nacht)
- Aandrang incontinentie- episodes van urineverlies.
- Aandrang- sterke aandrang om te urineren

Wat veroorzaakt een OAB?

De specifieke zenuwen en spieren rond uw blaas regelen de werking ervan. OAB wordt veroorzaakt wanneer deze regeling verstoord is, onder andere door:

- Zwangerschap en bevalling
- Bekkenoperatie
- Prostaatoperatie
- Medicatie
- Natuurlijke veroudering
- Chronische ziekte
- Trauma
- Zwaarlijvigheid

Hoe wordt OAB vastgesteld?

Om een diagnose te stellen, zal uw arts uw medische voorgeschiedenis nagaan, de werking van uw blaas testen en u vragen een dagboek bij te houden. In dat dagboek noteert u uw symptomen van aandrang en frequentie en voorvallen van incontinentie.

Welke behandelingen worden het meest voorgeschreven voor OAB?

Vaak voorkomende behandelingen die uw arts kan voorschrijven zijn:

- Aanpassing van inname van vloeistoffen
- Versterken van de bekkenbodemspieren
- Geneesmiddelen om de activiteit van de blaas te reduceren
- Neurostimulatie, het stimuleren van de zenuwen die uw blaas functie regelen

Wat is neurostimulatie?


De blaaswerking wordt geregeld door een groep zenuwen onderaan de ruggengraat, de sacrale zenuwen genoemd. Door deze zenuwen te stimuleren met zachte, elektrische pulsen (neurostimulatie) kan de activiteit van de blaas veranderd worden. Deze zenuwen kunnen gestimuleerd worden door het operatief plaatsen van een stimulator vlakbij uw ruggengraat die voortdurend impulsen stuurt naar de sacrale zenuwen.

Een andere manier om deze zenuwen te stimuleren is via Percutane Tibiale Zenuwstimulatie (PTNS) met behulp van het Urgent PC neuromodulatiesysteem. PTNS is een nieuwe, poliklinische en minimaal invasieve behandeling voor symptomen van OAB. PTNS stimuleert de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor de controle over de blaas indirect, via een zenuw in uw onderbeen – de tibiale zenuw.

Wat is een PTNS-behandeling?

Door middel van het Urgent PC-systeem wordt de PTNS-behandeling toegepast: een kleine, dunne naaldelektrode wordt ingebracht vlakbij de tibiale zenuw boven uw enkel en deze elektrode wordt dan aangesloten op een stimulator die op batterijen werkt. De impulsen van de stimulator verplaatsen zich langs uw zenuwbanen en helpen bij het trainen van de blaas, waardoor uw OAB-symptomen verlicht worden.

Elke behandeling duurt ongeveer 30 minuten. U krijgt aanvankelijk een reeks van 12 behandelingen, meestal 1 maal per week. Na de eerste 12 behandelingen zal uw arts uw reactie op de PTNS-behandelingen bespreken en bepalen hoeveel behandelingen u in de toekomst zult nodig hebben om uw resultaten te behouden.



Hoe snel kan ik resultaten verwachten?

Omdat PTNS langzaam de signalen wijzigt die leiden tot controle over uw blaas, zult u waarschijnlijk minstens 6 behandelingen nodig hebben om een verandering te zien in uw symptomen. De meeste patiënten die PTNS gebruiken, ervaren een aanzienlijke verbetering in de controle over hun blaas. Het is belangrijk dat u de aanbevolen 12 behandelingen met PTNS ondergaat alvorens u en uw arts evalueren of dit een geschikte behandeling is voor uw OAB.

URGENT[®] PC